

5. Stemstoornissen

Ouderen kunnen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik op latere leeftijd stemproblemen ontwikkelen. Ook bepaalde ziektebeelden kunnen bijdragen tot een stemprobleem. Stemproblemen belemmeren eveneens een optimale communicatie.

6. Akoepedie

Bij ouderen met een gehoordaling kunnen problemen op vlak van spraak en taal optreden, maar ook het functioneren in het sociale leven kan gehinderd worden.

Een hoorapparaat en gehoortraining kunnen helpen de problemen te beperken. Binnen de revalidatie leert men het oor opnieuw te 'luisteren'.

Ook personen die reeds een hoorapparaat hebben, kunnen nood hebben aan extra training om beginnende problemen te voorkomen.



Voor verdere uitleg of praktische inlichtingen kunt u altijd terecht op de praktijk of op onze website.

LOGOPRAXIS)))

Kerkstraat 1 » 9185 Wachtebeke
Bevrijdingslaan 21 » 9080 Lochristi

tel. 09 345 81 46
info@logopraxis.be
www.logopraxis.be

Jill De Smet » logopediste » 0486 61 31 97

INFORMATIEBROCHURE

Logopedie
voor senioren

LOGOPRAXIS)))

In deze beknopte informatiebrochure geven wij een overzicht van de mogelijke stoornissen die door een logopedist kunnen behandeld worden bij senioren. Het doel is een betere levenskwaliteit.

1. Spraakstoornissen ten gevolge van een hersenbeschadiging

Ouderen hebben nood aan een goede communicatie. Op oudere leeftijd verhoogt de kans op spraakstoornissen omdat de spraakspieren minder elastisch worden.

De belangrijkste vormen van verworven spraakstoornissen bij ouderen zijn dysarthrieën.

Bij een dysarthrie ontstaan er moeilijkheden bij het articuleren van woorden door een stoornis in de motorische zenuwen of in de zenuwen van de spieren die bij het spreken betrokken zijn. Men kan woorden en zinnen wel vinden, maar zij worden niet goed en duidelijk uitgesproken.

Spraakstoornissen bij een bepaald ziektebeeld:

- Bij **multiple sclerose** zien we een slordige articulatie, heesheid en stoornissen in luidheid en timbre van de stem.
- Ouderen met Parkinson en A.L.S. hebben moeite met spreken, slikken en de ademhaling.



2. Taalstoornissen ten gevolge van een hersenbeschadiging

Afasie is een taalstoornis waarbij alle taalmodaliteiten (spreken, schrijven, lezen, begrip) gestoord zijn.

Afasie ontstaat na een hersenletsel in het taalgebied. Bij de ouderen kan afasie eveneens het gevolg zijn van een cerebrovasculair accident of CVA (= beroerte, stroke) of bv. bij hersentumoren.

Ook progressieve ziektebeelden zoals Alzheimer, Multiple Sclerose, A.L.S., Chorea van Huntington, Parkinson, ... kunnen leiden tot hersenbeschadiging.



3. Dementie

Dementie is een ernstige vorm van verlies van geestelijke functies. Deze ziekte verhindert de persoon om nog normaal te functioneren in het sociale leven.

Dementerende ouderen kunnen volgende symptomen vertonen:

- Geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen
- Afasie (taalstoornissen) en apraxie (spraakstoornissen)
- Sociaal functioneren

- Zelfredzaamheid
- Persoonlijkheidsveranderingen
- ...

Voor licht dementerende bejaarden kan zowel communicatietraining (in groepssessies) als taaltraining (woordvindingsoefeningen en taaldenkeoefeningen) gegeven worden.

4. Dysfagie of slikstoornissen

Dysfagie is een stoornis in het slikken. De patiënt heeft het gevoel dat vast of vloeibaar voedsel blijft hangen of wordt gehinderd bij passage door de mond en slokdarm naar de maag. Er kan onderscheid worden gemaakt in hoge dysfagie (slik- en verslikklachten) of lage dysfagie (slokdarmpassageklachten).

Mensen met dysfagie kunnen volgende symptomen vertonen: gewichtsvermindering, hoesten tijdens of na het slikken, (nasale) oprisping, zuurbranden, neurologische klachten, verslikken, longontsteking, chronische bronchitis, ...

